



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Ταχ.Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ.Κώδικας : 311 00 Λευκάδα
Πληροφορίες : Κ. Κατωπόδης
Τηλέφωνο : 2645360746
FAX : 2645021745
Email: kkatopodis@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Aleurocanthus spiniferus* σε καλλιέργεια αμπελιού στην Π.Ε. Λευκάδας».

Σχετ: α) Το αριθμ. πρωτ. 90898/05-08-2026 έγγραφο της ΔΑΟΚ ΠΕ Λευκάδας με θέμα: «Πρόγραμμα επισκοπήσεων 2026»

β) Την με Α.Π.: ΕΠ 1342/07-08-2026 Έκθεση Αποτελεσμάτων-Δελτίο Αναλύσεων του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ).

Στα πλαίσια του Ετήσιου Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων 2026 για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, η υπηρεσία μας έστειλε στο Μ.Φ.Ι. δύο κίτρινες κολλητικές παγίδες μιας όψης που είχαν αναρτηθεί από 27/07/2026 έως 05/08/2026 σε αμπέλι στην περιοχή Καλλιγονίου της Π.Ε. Λευκάδας για το έντομο *Scaphoideus titanus*, φορέα του φυτοπλάσματος *Grapevine flavescens doree*. Μετά την εξέτασή τους από το ΜΦ.Ι. και σύμφωνα με το β) σχετικό διαπιστώθηκε σ' αυτές η παρουσία ατόμων του είδους *Aleurocanthus spiniferus* (μαύρος ακανθώδης αλευρώδης).

Ο μαύρος ακανθώδης αλευρώδης είναι ενωσιακό επιβλαβές έντομο καραντίνας που η παρουσία του στο έδαφος της Ένωσης είναι γνωστή από το 2008 όταν εντοπίστηκε στην περιοχή της Απουλίας της Ιταλίας. Στην Ελλάδα εντοπίστηκε πρώτη φορά το 2016 στο νησί της Κέρκυρας, όπου παρατηρήθηκε εκτεταμένη προσβολή σε εσπεριδοειδή, τριανταφυλλιές και αμπέλια. Έκτοτε έχει εντοπιστεί σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Το έντομο αποτελεί σημαντικό εχθρό των εσπεριδοειδών αλλά μπορεί να βρεθεί σε πάνω από 95 είδη φυτών. Μεταξύ των ειδών που προσβάλλει, πέρα από τα εσπεριδοειδή, συγκαταλέγονται το αμπέλι, οι τριανταφυλλιές, η συκιά, η ροδιά, η μηλιά, η αχλαδιά, η μουριά, η δάφνη, ο κισσός, η ιτιά κ.λπ. ενώ εγκαθίσταται σε καλλιέργειες, φυσική βλάστηση και σε αστικό πράσινο (πάρκα, ιδιωτικούς κήπους κ.λπ.).

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της προσβολής από *Aleurocanthus spiniferus* είναι η ανάπτυξη πυκνών αποικιών προνυμφών του εντόμου στο κάτω μέρος του φυλλώματος. Τα ενήλικα παραμένουν στις ίδιες θέσεις και πετούν μόνο σε περίπτωση που ενοχληθούν. Τα φύλλα και τα φρούτα φέρουν κηλίδες μελιτωμάτων, στα οποία στη συνέχεια αναπτύσσεται ο μύκητας της καπνιάς. Σε εκτεταμένες προσβολές τα φυτά αποκτούν σχεδόν πλήρη μαύρη εικόνα.

Η μετακίνηση και διασπορά του εντόμου σε κοντινές αποστάσεις γίνεται με το πέταγμα των ενήλικων εντόμων με τη βοήθεια του ανέμου και μόνο όταν ενοχληθούν. Η διασπορά σε μεγάλες αποστάσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με μεταφορά προσβεβλημένου φυτικού υλικού (φυτά προς φύτευση, μέρη φυτών, καρποί) είτε με την προσκόλληση ενήλικων εντόμων πάνω σε ανθρώπους, φορτία, οχήματα.

Τα χαρακτηριστικά του *Aleurocanthus spiniferus* που τον καθιστούν απειλητικό εχθρό είναι:

- 1) Η ικανότητά του να προσβάλλει μεγάλο εύρος ξενιστών.
- 2) Η απουσία αποτελεσματικών φυσικών εχθρών στην Ευρώπη.
- 3) Η μη αποτελεσματική καταπολέμηση με κλασσικά εντομοκτόνα
- 4) Η μείωση και υποβάθμιση της παραγωγής των εσπεριδοειδών.
- 5) Η καταστροφή του νεαρού φυλλώματος και εξασθένηση των δέντρων.

Στα μέτρα αντιμετώπισης του εντόμου περιλαμβάνονται:

- 1) Η χρήση υγιούς πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.
- 2) Η αποφυγή μετακίνησης μολυσμένου φυτικού υλικού (φυτωριακό υλικό, καρποί από μολυσμένα δέντρα, άνθη).
- 3) Το κλάδεμα και η καύση προσβεβλημένων κλαδιών.
- 4) Ο συστηματικός έλεγχος των καλλιεργειών για τη διαπίστωση τυχόν συμπτωμάτων και η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών (ΔΑΟΚ και ΠΚΠΦΠ&ΦΕ) σε περίπτωση εντοπισμού τους.
- 5) Επεμβάσεις με ήπια προς τα ωφέλιμα έντομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στα αρχικά στάδια της προσβολής καθώς και κατά τη χειμερινή περίοδο έως την άνοιξη πριν την εμφάνιση των ενηλίκων.

Για τις ανάγκες ενημέρωσης των υπόχρεων/ενδιαφερόμενων για τη διαπίστωση της παρουσίας του ενωσιακού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Aleurocanthus spiniferus*, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών νέων κρουσμάτων, η Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ έχει δημιουργήσει σχετικό φυλλάδιο το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://www.minagric.gr/farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/fytoygeia>.

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην προσπάθειά του για τη βιολογική αντιμετώπιση του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη, εισήγαγε και απελευθέρωσε σε περιοχές της χώρας μας που έχουν παρατηρηθεί σημαντικές προσβολές, τα ωφέλιμα έντομα, αρχικά το *Encarsia smithi* και εν συνεχεία το *Amitus espidum*, φυσικοί εχθροί και τα δύο του *Aleurocanthus spiniferus*.

Ε.Π.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

Πίνακας Διανομής

- 1) Αγροτικός Οικοποιοηηηικός & Ελαιοοργηικός Σοο/σμός Λεοκάδας “ΤΑΟΛ” (taol@otenet.gr)
- 2) Γεωποοηικό Σπίτι - Αθάνατος Ηλίας (lefkasgarden@gmail.com)
- 3) Γεωτεχνηκή – Σκλαβενίτη Δήμητρα (geotexnikilefkada@gmail.com)
- 4) Μαραγκός Γεώργιος (georgiosmaragosarkan1985@gmail.com)
- 5) Θεόδωρος Λάζαρης (tlazarhs@gmail.com)
- 6) Ροοτογιάννης Νικόλαος (ronto_gardening@hotmail.com)
- 7) Πολίτης Αθαάσιος (sakispolititis@yahoo.gr)
- 5) Δήμος Λεοκάδας (info@lefkada.gov.gr)
- 6) Δήμος Μεγαοησίου (contact@1419.syzefxis.gov.gr)
- 7) Κοιόότητα Καλάμου (panosgianniwtis13@gmail.com)
- 8) Κοιόότητα Καστού (kastos@lefkada.gov.gr)
- 9) Φυτοϋγειοοοηικοί ελεγκτές ΔΑΟΚ ΠΕ Λεοκάδας (fytoygeia.lefkada@pin.gov.gr)
- 10) Γραφείο Αγροηικής Αάαπτυξης και Ελέγγων Νομού Λεοκάδας (keplef@minagric.gr)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1) Τμήμα Πληροφοηικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λεοκάδας
(για αάάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)